



Назва ТВП: Балота Спораўскае



© С. Левый

Код: BY022

Геаграфічныя каардынаты: 52°24' N 25°18' E

Адміністрацыйная прыналежнасць: Брэсцкая вобласць: Бярозаўскі раён, Драгічынскі раён, Іванаўскі раён, Івацэвіцкі раён

Плошча: 20169 га

Крытэры: A1, B2, B3

Нацыянальны прыродаахоўны статус: ландшафтны заказнік рэспубліканскага значэння «Спораўскі»

Міжнародны прыродаахоўны статус: ТВП міжнароднага значэння, утворана ў 1998 годзе. Рамсарская тэрыторыя з 1999 г. (крытэрыі 1, 2)

Агульнае апісанне:

Тэрыторыя ўяўляе сабой адзін з буйнейшых у Еўропе комплекс пойменных нізінных балот, якія захаваліся ў натуральным стане. Дзякуючы сваім памерам балотны масіў застаецца стабільнай экасістэмай, якая ў пэўнай ступені не залежыць ад змен на прылягаючых тэрыторыях.

У цэнтры заказніка працякае рака Ясельда з вельмі звлістым і зарослым воднай расліннасцю рэчышчам. Пойма шырынёй ад 0,5 да 2 кіламетраў з абодвух бакоў рэчышча ўяўляе сабой тыповае нізіннае балота. У цэнтры заказніка знаходзіцца возера Спораўскае. Асноўная частка тэрыторыі заказніка занята адкрытымі нізіннымі балотамі (43,2%), нізінныя балоты з мазаічна размешчанымі хмызнякамі займаюць 17,9% плошчы, на долю балот, парослых хмызнякамі, прыходзіцца 4,1%. Сярод балот раскіданы шматлікія невысокія пагоркі і ўзвышшы (мінеральныя астравы). У мінулым мінеральныя астравы былі пакрыты дубова-хваёвымі лясамі, але пазней іх высеклі і гэтыя ўчасткі сталі выкарыстоўваць у якасці выганаў і пашаў. У цяперашні час большая частка сельскагаспадарчых тэрыторый закінута і на іх аднаўляецца натуральная расліннасць.

Раней, да меліярацыі, гідралагічны рэжым ракі Ясельда быў тыповым для раўнінных рэк: кожную вясну бывала высокая паводка, якая змянялася летней межанню. На працягу ўсяго года здараліся рэдкія навадненні, выкліканыя ападкамі. У цяперашні час увесь участак ракі Ясельда вышэй заказніка выпрамлены і зарэгуляваны. На рацэ створаны вадасховішча і рыбгас «Сялец», ад дзейнасці якіх залежыць гідралагічны рэжым на тэрыторыі заказніка. У апошнія гады веснавыя паводкі адсутнічаюць, затое пачасціліся летнія навадненні. Парушэнне гідралагічнага рэжыму прыводзіць да інтэнсіўнага зарастання рэчышча ракі і возера, да штогодніх затапленняў поймы ці, наадварот, моцных засух і пажараў.

Забалочаная пойма характарызуецца ўнікальным, хаця і не вельмі багатым складам раслін. Адзначана крыху больш за 600 відаў раслін. Звязана гэта з тым, што нешматлікія ўзвышэнні рэльефу (мінеральныя астравы), якія робяць больш разнастайнай бедную флору балот, у значнай ступені трансфармаваны. На тэрыторыі заказніка налічваецца 18 відаў раслін, занесеных у Чырвоную кнігу Беларусі, і 13 відаў, якія маюць рэгіянальную значнасць. Акрамя гэтага, тут адзначаны ўнікальныя супольнасці травяністай расліны булаваносца сівога *Согунерphoretum canescentis*, якія прыстасаваліся да росту на сухіх пячаных выспах ва ўмовах, неспрыяльных для выжывання іншых відаў раслін.

Тэрыторыя заказніка выкарыстоўваецца для наступных відаў гаспадарчай дзейнасці: сенакашэння і выпасу жывёлы (10-15% плошчы), лясной гаспадаркі, палявання і рыбнай лоўлі. На прылягаючых да ўгоддзя, у асноўным меліяраваных, землях вырошчваюцца прапашныя і зерневыя культуры.

Асноўныя біятопы:

Нізінныя балоты – 51,1%, лясы – 32,8%, азёры, вадасховішчы, залітыя вадой торфавырабаткі, рэкі і каналы – 8,9%, лугі – 3,4%, іншыя біятопы – 2,8%.

Птушкі:

Усяго на гнездаванні ў заказніку адзначана 123 віды птушак.

Тэрыторыя з'яўляецца вызначальным месцам гнездавання віда, які знаходзіцца пад глабальнай пагрозай знікнення вяртлявай чаротаўкі *Acrocephalus paludicola*. Тут гняздуецца каля 9% сусветнай папуляцыі і адзначана самая высокая ў свеце шчыльнасць гэтага віду. Заказнік забяспечвае існаванне папуляцый цэлага шэрагу рэдкіх і знікаючых відаў птушак, сярод якіх два віды (драч *Crex crex* і дубальт *Gallinago media*) таксама знаходзяцца пад глабальнай пагрозай знікнення, а 20 занесены ў Чырвоную кнігу Беларусі. Акрамя гэтага, тэрыторыя заказніка падтрымлівае папуляцыю чаплі-бугая *Botaurus stellaris*, якая мае міжнародную значнасць, і папуляцыю чорнага бусла *Ciconia nigra* нацыянальнай значнасці.

Іншыя групы жывел:

Фауна ТВП дастаткова разнастайная: 24 віда звяроў, 6 відаў рэптылій, 8 відаў амфібій, 34 віда рыб.

Стан рэдкіх відаў птушак:

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды | Крытэрыі ТВП |
|--|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------|--------------|
| Качка-шылахвостка <i>Anas acuta</i> | гн | 1-5 п | 2007 | Э | | |
| Чапля-бугай <i>Botaurus stellaris</i> | гн | 10-20 с | 2007 | Э | | |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды | Крытэрыі ТВП |
|---|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------|--------------|
| Чапля-лазянік <i>Ixobrychus minutus</i> | гн | 5-10 п | 2007 | Э | | |
| Чапля вялікая белая <i>Casmerodius albus</i> | мг | + | 2007 | П | | |
| Чорны бусел <i>Ciconia nigra</i> | гн | 5 п | 2007 | Д | | |
| Арлан-белахвост <i>Haliaeetus albicilla</i> | зал | + | 2007 | Д | | |
| Арол-вужаед <i>Circaetus gallicus</i> | гн | 1-2 п | 2007 | Э | | |
| Лунь палявы <i>Circus cyaneus</i> | гн | 3 п | 2007 | Д | ↔ | |
| Малы арлец <i>Aquila pomarina</i> | гн | 1 п | 2007 | Д | ↔ | |
| Арлец вялікі <i>Aquila clanga</i> | гн | 1 п | 2002 | Д | ↓ | |
| Арлец вялікі <i>Aquila clanga</i> | гн | + | 2007, 2010 | Д | ↓ | |
| Сокал-пустальга <i>Falco tinnunculus</i> | гн | 1-2 п | 2007 | Э | | |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды | Крытэрыі ТВП |
|---|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------|--------------|
| Сокал-шуленак <i>Falco vespertinus</i> | мг | + | 2007 | П | | |
| Сокал-кабец <i>Falco subbuteo</i> | гн | 2-3 п | 2007 | Э | | |
| Пагоніч малы <i>Porzana parva</i> | гн | 20-30 п | 2007-2010 | Э | | |
| Драч <i>Crex crex</i> | гн | 15 с | 2010 | Д | | |
| Журавель шэры <i>Grus grus</i> | гн | 3-4 п | 2007 | Э | | |
| Баталён <i>Philomachus riphaeus</i> | мг | + | 2007 | П | | |
| Стучок <i>Lymnocyptes minimus</i> | мг | + | 2007 | П | | |
| Дубальт <i>Gallinago media</i> | гн | 42-47 с | 2010 | Д | ↑ | A1 |
| Грыцук вялікі <i>Limosa limosa</i> | гн | 5-10 п | 2007 | Э | | A1 |
| Кулён вялікі <i>Numenius arquata</i> | гн | 2-5 п | 2007 | Э | | |
| Кулік-селянец <i>Tringa nebularia</i> | мг | + | 2007 | П | | |
| Чайка малая <i>Hydrocoloeus minutus</i> | гн | 5-15 п | 2007 | П | | B2 |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды | Крытэрыі ТВП |
|---|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------|--------------|
| Чайка шызая <i>Larus canus</i> | мг | + | 2007 | П | | |
| Крычка малая <i>Sternula albifrons</i> | зал | + | 2007 | П | | |
| Рыбачка белашчокая <i>Chlidonias hybrida</i> | гн | + | 2007 | П | | |
| Рыбачка чорная <i>Chlidonias niger</i> | гн | 100-200 п | 2007 | Э | | В2 |
| Сава балотная <i>Asio flammeus</i> | гн | 1-6 п | 2007 | Э | | |
| Звычайны зімародак <i>Alcedo atthis</i> | гн | 2-5 п | 2007 | Э | | |
| Дзяцел беласпінны <i>Dendrocopos leucotos</i> | гн | 5-10 п | 2007 | Э | | |
| Цвыркун салаўіны <i>Locustella luscinioides</i> | гн | 100-200 п | 2007 | Э | | В3 |
| Чаротаўка вяртлявая <i>Acrocephalus paludicola</i> | гн | 491-517 с | 2011 | Д | ↓ | А1 |

| Віды | Статус | Колькасць | Год/перыяд ацэнкі | Дакладнасць ацэнкі | Трэнды | Крытэрыі ТВП |
|--|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------|--------------|
| Сініца вусатая <i>Panurus biarmicus</i> | гн | 10-20 п | 2007 | Э | | |

Іншыя рэдкія і знаходзячыся пад пагрозай знікнення віды:

Звяры: барсук *Meles meles*.

Амфібіі: чаротавая рапуха *Bufo calamita*, грабенчыты трытон *Triturus cristatus*.

Рэптыліі: балотная чарапаха *Emys orbicularis*.

Насякомыя: фіялетавае жужаль *Carabus violaceus*, залацістаямачны жужаль *Carabus clathratus*, жужаль менетрые *Carabus menetriesi*, жужаль бляскучы *Carabus nitens*, рашэцісты жужаль *Carabus cancellatus*, баразнаваты слізняед *Chlaenius costulatus*, чатырохбаразнаваты слізняед *Chlaenius sulcicollis*, прыгожая нехаленія *Nehalennias speciosa*, пясчаны скакун *Cicindela arenaria viennensis*, звычайны мечнік *Conocephalus discolor*, сфагнавы вадамер *Gerris sphagnetorum*.

Расліны: пылкагалоўнік чырвоны *Cephalanthera rubra*, ядрушка даўгарогая *Gymnadeniacaonopsea*, венерын чаравічак сапраўдны *Cypripedium calceolus*, касач сібірскі *Irissibirica*, падвей стройны *Eriophorum gracile*, асака ценявая *Carex umbrosa*, гарычка крыжападобная *Gentiana cruciata*, граздоўнік многараздзельны *Botrychium multifidum*, лікападыела заліўная *Lycopodiella inundata*, тайнік яйцападобны *Listera ovata*, крапіва кіеўская *Urtica kioviensis*, гайнік цёмна-чырвоны *Epipactis atrorubens*, чараўнік зеленакветкавы *Platanthera chlorantha*, верабейнік лекавы *Lithospermum officinale*, гарлачык белы *Nymphaea alba*.

Пагрозы:

- Нестабільнасць гідралагічнага рэжыму ракі Ясельда.
- Забруджванне вады цяжкімі металамі, пестыцыдамі, арганічнымі рэчывамі.
- Узворванне глебы на мінеральных астравах, дзе растуць рэдкія віды раслін.
- Скарачэнне сенакашэння з'яўляецца асноўнай прычынай зарастання адкрытых нізінных балот хмызнякамі.
- Штогоднае веснавое выпальванне расліннасці практыкуецца мясцовым

насельніцтвам і наносіць істотную страту біялагічнай разнастайнасці. Асабліва буйныя пашкоджанні адбываюцца ва ўмовах сухой вясны і адсутнасці паводак, калі разам з расліннасцю выпальваецца верхні пласт глебы, карэнні раслін і гінуць усе насякомыя. На такіх выпаленых балотах і лугах большасць відаў птушак перастае гнездавацца.

Рэкамендацыі па захаванню:

У 2001 годзе распрацаваны план кіравання заказнікам «Спораўскі», у якім змешчаны рэкамендацыі па вырашэнню большасці пералічаных вышэй праблем. Асноўная ўвага ў плане ўдзелена вырашэнню праблем, звязаных з колькасцю і якасцю вады. З 2011 г. пачата механізаванае кашэнне тэрыторыі поймы, для прадухілення зарастання адкрытых балот хмызнякамі.

Крыніцы інфармацыі:

Асабістыя паведамленні: Дамброўскі В.Ч., Малашэвіч У.У., Левы С.В.

Отчет по НИР на тему «Проведение учётов индикаторных видов животных в заказниках «Споровский», «Званец», «Средняя Припять» и «Простырь». Науч. Руководитель Карлионова Н.В., Минск., 2010. – 56 с.

План управления республиканским ландшафтным заказником «Споровский» (разработан ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 2009 г.)

Скарбы прыроды Беларусі. – Мн.: Беларусь, 2005. – 215 с. (Інфармацыю падрыхтавалі: Вяргейчык Л.А., Грычык В.В., Казулін А.В., Парэйка А.А., Скуратовіч А.М., Сцепановіч Я.М., Фладэ М.)

Складальнікі : Левы С.В.

** Выкарыстанне змешчанай тут неапублікаванай інфармацыі для навуковых публікацый без пісьмовай згоды яе аўтараў забаронена. У выпадку выкарыстання часткі кантэнту або старонкі цалкам на іншых інтэрнет-рэсурсах, абавязковая спасылка на аўтараў і сайт iba.ptushki.org*