

## Important Bird Area: Arechaŭskaje



© С. Левый

**Code:** BY051

**Central coordinates:** 51° 38' N 23° 55' E

**Location:** Brestskaya voblast: Malaryta region

**Area:** 3814 ha

**IBA Criteria:** A1, B3

**National conservation status:** частка тэрыторыі ў складзе Біялагічнага заказніка мясцовага значэння «Арэхаўскі» (1510 га)

**International conservation status:** ТВП міжнароднай значнасці, утворана ў 2010 годзе. Перспектыўная частка беларускага сектару міжнароднага біясфернага рэзервату «Заходняе Палессе»

### Site description:

Тэрыторыя ўяўляе сабою адносна невялікі леса-водна-балотны комплекс, у склад якога ўваходзяць: вялікі вадаём – воз. Арэхаўскае, цалкам захаванае ў натуральным стане; затоплены ўчастак выпрацаваных торфапляцовак, на якім адбываюцца працэсы другаснага забалочвання; а таксама размешчаныя навокал лясныя масівы, фрагменты нізінных і пераходных балот і лугоў.

Ядром ТВП з'яўляецца воз. Арэхаўскае і былая торфапляцоўка - ўрочышча Разлівы. Возера размешчана ў басейне р. Рыта, правага прытоку р. Мухавец –

басейна р. Заходні Буг і з'яўляецца пятым па плошчы ў басейне Бугу і самым вялікім натуральным вадаёмам беларускай часткі басейну. Максімальная даўжыня возера 3,11 км, шырыня 2,03 км, сярэдняя глыбіня каля 1 м. Берагі нізкія моцна забалочаныя, парослыя лесам. Сучасны гідралагічны рэжым басейна возера абумоўлены рэалізаванымі ў 1965-1984 гг. гідрамеліяратывнымі мерапрыемствамі, у выніку якіх плошча вадасбору паменшылася ў 17 разоў (Якушко, Власов, 1998). Негледзячы на значныя змяненні ў паверхні вадасбору, само возера і яго ўзбярэжжы захавалася ў натуральным стане. У 1984 годзе на паўночны-захад ад возера пачалася распрацоўка торфапляцоўкі «Арэхава-2» ва ўр. Разлівы. Пераразмеркаванне вады ажыццяўлялася пры дапамозе часовай насоснай станцыі ў воз. Арэхаўскае, далей у раку Маларыта і праз сістэму каналаў у воз. Олтушкае. На пачатку 1990-х гадоў торфаздабыча і адпампоўванне вады былі прыпынены. Пасля гэтага пачалося інтэнсіўнае другаснае забалочванне тэрыторыі торфапляцоўкі. Сёння былая торфапляцоўка прадстаўляе сабой другасна затоплены і забалочаны мелкаводны вадаём з сеткай унутраных і абвадных каналаў. У паўночнай частцы торфапляцоўка і возера злучаны каналам. Падчас летне-асенняй межані гэтая сувязь перарываецца. У апошнія гады гідралагічны рэжым возера і торфапляцоўкі стабілізаваўся. На паўднёв-усходняй граніцы ТВП размешчаны канал які дае пачатак р. Маларыта.

Асноўнымі экасістэмамі найбольш распаўсюджанымі ў межах ТВП з'яўляюцца: водныя (натуральных і штучных вадаёмаў), лясныя, а таксама лугавыя і балотныя. Пераважаюць лясныя, балотна-лугавыя, узбярэжна-водныя раслінныя супольнасці. Вышэйшая водная расліннасць займае каля 33% паверхні возера і каля 50% паверхні торфапляцоўкі. З надводнай расліннасці дамінуе трысняг, субдамінантамі з'яўляюцца камыш азёрны і рагоз вузкалісты. Вялікай разнастайнасцю асацыяцый характэрызуецца вадаёмы ўр. Разлівы, дзе назіраецца больш менш раўнамернае чаргаванне зарасляў надводнай расліннасці і ўчасткаў адкрытай вады. У межах ТВП таксама размешчаны самы вялікі на паўднёвым захадзе і ў межах беларускай часткі басейну р. Заходні Буг поймавы луг, які захаваўся ў натуральным стане. Прадстаўлены таксама асобнымі участкамі пераходныя і нізінныя балоты. Дзякуючы разнастайнасці прыродных ўмоў тут таксама прадстаўлены разнастайныя лясы (разам 13 тыпаў). Найбольш распаўсюджаны сасновыя, бярозавыя і альховыя лясы. Сустрэкаюцца асобнымі фрагментамі дубовыя лясы.

У межах ТВП размешчаны невялікі населены пункт – вёска Перавысь, ля граніц вёскі: Арэхава і Дрочава. Граніцы ТВП выразна азначаны асабліва на захадзе і поўдні (граніца з Украінай) поўначы (аўтамабільная дарога Р17 Кобрын-Уладава),

усходзе гравійнымі і грунтовымі дарогамі. ТВП мяжуе з Шацкім прыродным нацыянальным паркам і біясферным рэзерватам – Украіна.

## **Habitats:**

лясы – 70% (у асноўным сасновыя), азёры – 12%, другасна забалочаныя тарфянікі – 5%, палі – 5%, нізінныя і пераходныя балоты – 5%, поймавыя лугі – 3%.

## **Birds:**

Арнітафаўна ТВП налічвае 182 віда птушак з 46 сямейств 17 атрадаў. На гнездаванні адзначана 134 віда з 41 сямейства 16 атрадаў. Толькі на міграцыі адзначана 37 відаў і 8 відаў з’яўляюцца залетнымі. На тэрыторыі ТВП адзначана каля 40 відаў птушак з Чырвонай кнігі Рэспублікі Беларусь. У тым ліку: 6 відаў – II катэгорыя аховы, 19 – III і 11 – IV. З іх 21 від з’яўляецца гняздуючым ці гнездаванне верагодна, у тым ліку па катэгорыям: II катэгорыя аховы – 4 відаў, III катэгорыя аховы – 11 відаў, IV катэгорыя аховы – 6 відаў. Акрамя гэтага адзначана 9 відаў птушак з спіска відаў патрабуючых увагі, 5 з іх гняздуюць тут.

Тэрыторыя ТВП з’яўляецца важным месцам гнездавання многіх водна-балотных і лясных птушак, у тым ліку глабальнага пагражамых відаў вялікага грызкука *Limosalimosai* дубальта *Gallinago media*. Вяскою мае важнае значэнне для мігруючых птушак (гусі, качкі, кулікі).

Міжнароднае значэнне тэрыторыі абумоўліваецца наяўнасцю відаў маючых Еўрапейскі і глабальны прыродаахоўны статус. Тут адзначаны на гнездаванні віды, якія згодна з міжнародным саюзам аховы прыроды (IUCN), адносяцца да катэгорыі ўязвімыя (V): чапля-лазняк *Ixobrychus minutus*, качка-шылахвостка *Anas acuta*, арлан-белахвост *Haliaeetus albicilla*, дубальт *Gallinago media*. Яшчэ 14 відаў адносяцца да катэгорыі рэдкія (R). Больш за 30 гняздуючых відаў маюць Еўрапейскі Статус Пагрозы (European Threat Status) катэгорыі: D – памяншаючыя колькасць, R – рэдкія, V – уязвімыя.

## **Other animal groups:**

На тэрыторыі ТВП адзначана больш за 30 відаў млекакормячых, у тым ліку такія віды як: лось, бобр, выдра, арэшнікавая соня і інш. Адзначана 6 відаў амфібіяў і 6 відаў рэптылій.

## Populations of IBA trigger species:

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends (2004-2010)	IBA criteria
Greylag goose <i>Anser anser</i>	B	2-5 breeding pairs	2004-2010	Poor		
Gadwall <i>Anas strepera</i>	B	15-20 breeding pairs	2004-2010	Good	↔	B2
Pintail <i>Anas acuta</i>	B	0-1 breeding pairs	2004-2010	Poor		
Smew <i>Mergus albellus</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Red-breasted goosander <i>Mergus serrator</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Goosander <i>Mergus merganser</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Black-throated diver <i>Gavia arctica</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Red-necked grebe <i>Podiceps grisegena</i>	B	1-3 breeding pairs	2004-2010	Poor		
Bittern <i>Botaurus stellaris</i>	B	15-20 breeding pairs	2004-2010	Medium	↔	
Little bittern <i>Ixobrychus minutus</i>	B	2-5 breeding pairs	2004-2010	Poor		

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends (2004-2010)	IBA criteria
Night heron <i>Nycticorax nycticorax</i>	N	+	2004-2010	Poor		
Great white egret <i>Casmerodius albus</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Black stork <i>Ciconia nigra</i>	B	1-3 breeding pairs	2004-2010	Poor		
White-tailed eagle <i>Haliaeetus albicilla</i>	B	1 breeding pairs	2004-2010	Poor		
Lesser spotted eagle <i>Aquila pomarina</i>	B?	+	2004-2010	Poor		
Osprey <i>Pandion haliaetus</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Hobby <i>Falco subbuteo</i>	B?	+	2004-2010	Poor		
Little crane <i>Porzana parva</i>	B	25-30 breeding pairs	2004-2010	Medium	↔	B3
Corncrake <i>Crex crex</i>	B	15-20 males only	2004-2010	Medium	↔	
Crane <i>Grus grus</i>	B	+	2004-2010	Poor		
Ringed plover <i>Charadrius hiaticula</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Golden plover <i>Pluvialis apricaria</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Ruff <i>Philomachus pugnax</i>	P	+	2004-2010	Poor		

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends (2004-2010)	IBA criteria
Jack snipe <i>Lymnocyptes minimus</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Great snipe <i>Gallinago media</i>	B?	+	2004-2010	Poor		
Black-tailed godwit <i>Limosa limosa</i>	B	10-15 breeding pairs	2004-2010	Good	↔	A1
Whimbrel <i>Numenius phaeopus</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Curlew <i>Numenius arquata</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Greenshank <i>Tringa nebularia</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Common gull <i>Larus canus</i>	P	+	2004-2010	Poor		
Whiskered tern <i>Chlidonias hybrida</i>	P	60-65 breeding pairs	2004-2010	Poor		
Black tern <i>Chlidonias niger</i>	B	0-60 breeding pairs	2004-2010	Good	↔	B2
Eagle owl <i>Bubo bubo</i>	B	1 breeding pairs	2004-2010	Poor		
Kingfisher <i>Alcedo atthis</i>	B	+	2004-2010	Poor		
Green woodpecker <i>Picus viridis</i>	B	1-5 breeding pairs	2004-2010	Poor		

Species	Season	Quality of estimate	Period	Quality of estimate	Trends (2004-2010)	IBA criteria
White-backed woodpecker <i>Dendrocopos leucotos</i>	B	+	2004-2010	Poor		
Collared flycatcher <i>Ficedula albicollis</i>	B?	0-2 breeding pairs	2004-2010	Poor		
Savi`s warbler <i>Locustella luscinioides</i>	B	50-60 breeding pairs	2004-2010	Medium	↔	B3
Bearded reedling <i>Panurus biarmicus</i>	P	+	2004-2010	Poor		

### Other biodiversity:

Насякомыя: рашэцісты жужаль *Carabus cancellatus*, жужаль фіялетава *Carabus violaceus*, жужаль шчыгрынава *Carabus coriaceus*, бражнік Празерпіна *Proserpinus proserpina*, малое начное паўлінава вока *Eudia pavonia*, мохавы чмель *Bombus muscorum*.

Расліны: альдраванда пухіркаватая *Aldrovanda vesiculosa*, зубніца клубняносная *Dentaria bulbifera*, шалфей лугавы *Salvia pratensis*, гайнік цёмна-чырвоны *Eripactis atrorubens*.

### Threats:

- асушальная меліярацыя і будова каналаў;
- забудова ў прыбярэжнай паласе;
- некантраляваны выпал травяністай расліннасці;
- перавыпас сельскагаспадарчых жывёл;
- зарастанне адкрытых біятопаў;
- інтрадукцыя драпежнікаў;
- веснавое паляванне;

- рубкі лесу, асабліва суцэльныя галоўнага карыстання;

## **Recommendations for the conservation:**

- Забараніць правядзенне асушальнай меліярацыі, будаўніцтва ў прыбярэжнай паласе, а таксама абмежаваць характар ляснага карыстання, у прыватнасці суцэльныя рубкі лесу галоўнага карыстання.
- На дадзенай тэрыторыі мэтазгодна ў перыяд вясновай міграцыі ўводзіць абмежаванні на любую дзейнасць, асабліва паляванне.
- Неабходна кашэнне на некаторых частках лугу (штогод, або раз на два гады) у жніўні, а таксама магчыма мэтазгодна правядзенне кантраляваных палаў на прыканцы зімы пачатку вясны, калі на лузе існуе снегавое покрыва, альбо высокі узровень вады.
- Неабходны штогадовы маніторынг стану папуляцый птушак і пагроз.

## **References:**

Абрамчук А.В. ООПТ Брестского Полесья и территория перспективная для включения в состав Белорусской части МРБ "Западное Полесье" //Экологические коридоры, методика проектирования, реализация. Международный экологический коридор реки Буг. Люблинский Католический Университет 20-21 ноября 2002 г. Пяски, 2002. – С. 156-161.

Абрамчук А.В., Абрамчук С.В., Бакур Ю.Ю., Сербун С.С., Хвалец А.С., Прокопчук В.В., Богданович И.А. Редкие гнездящиеся водно-болотные птицы аквальных лентических экосистем Брестского Полесья. //Красная книга Республики Беларусь: состояние, проблемы, перспективы. мат. Респ. науч. конф. 12-13 декабря 2002 г. УО "ВГУ им. П.М. Машерова" – Витебск: Изд-во УО "ВГУ им. П.М. Машерова". 2002. – с.32-34.

А.В. Абрамчук, С.В. Абрамчук Гнездование серого гуся в Брестском Полесье. //Природное асяроддзе Полесья: сучасны стан і яго змены: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі Брест 2002.

А.В. Абрамчук, С.В. Абрамчук Редкие виды птиц бассейнов Олтушского и Ореховского озе // Беркут. Т.11, вып. 2. 2003. – С. 148-150.

С.В. Абрамчук, А.В. Абрамчук, И.А. Богданович, А.А. Сербун Осенние скопления водно-болотных видов птиц на водоемах Брестского Полесья. //



Экологической науке – творчество молодых Материалы III Региональной научно-практической конференции ведущих специалистов, аспирантов и студентов, Гомель, апрель 2003 года. – Гомель, 2003. – С. 5-6.

А.В. Абрамчук, С.В. Абрамчук, Ю.Ю. Бакур, И.В. Богданович, С.В. Левый, В.В. Прокопчук, А.А. Сербун, В.А. Лихван Встречи редких видов птиц в Брестской области в 2002 г. //Авифауна Украины, Выпуск 2, 2003, с.48-52.

С.В. Абрамчук, А.В. Абрамчук С.В Гнездование белошекой крачки (*Chlidonias hybridus*) в Брестском Полесье // Экологические проблемы Полесья и сопредельных территорий: Материалы V Международной научно-практической конференции. – Гомель, октябрь 2003 года. – Гомель, 2003. – С. 7-8.

А.В. Абрамчук, С.В. Абрамчук Некоторые данные по редким видам птиц территорий перспективных для включения в состав Белорусского сектора международного резервата биосферы «Западное Полесье» // Состояние природных комплексов крымского природного заповедника и других заповедных территорий Украины, их изучение и охрана. Мат-лы научно-практич. конференции, посвящ. 80-летию Крымского природного заповедника. Алушта, 2003 – С. 192-194.

А.В. Абрамчук Уникальные орнитокомплексы западной части Брестского Полесья. //Брэсцкі геаграфічны веснік, том 1, выпуск 1. (Природныя і антрапагенныя ландшафты Палесся: праблемы прыродакарыстання і аховы навакольнага асяроддзя). Брэст, УА “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, 2003 – С. 63-74.

А.В. Абрамчук, С.В. Абрамчук, А.А. Сербун, Ю.Ю. Бакур, И.А. Богданович, В.В. Прокопчук Результаты изучения редких и охраняемых птиц в Брестском Полесье //Материалы II международной научно-практической конференции “Учеты птиц: подходы, методики, результаты”. 26-30 апреля 2004. Житомир, 2004.

Максименков М.В., Вежновец В.В., Скуратович А.Н., Дубовик Д.В., Абрамчук А.В., Абрамчук С.В. Состояние биологического состояния проектируемого заказника “Ореховский” //Природнае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця: тэзісы дакл. III Міжнар. навук. канф. (Брэст, 7-9 чэрв. 2006 г.). / рэдкал.: М.В. Міхальчук (адк. рэд.), [і інш.]. – Брэст: Академия, 2006. – С. 130.

Китель Д.А. Абрамчук С.В. Абрамчук А.В. Новое место гнездования шилохвости (*Anas acuta*) в Беларуси. *Subbuteo*. 2008. – Т. 9. – С. 51-52.

Китель Д.А., Абрамчук С.В., Абрамчук А.В., Новое место гнездования

галстучника (*Charadrius hiaticula*) в Беларусі. // Збереження та вшдтворення біорізноманіття природно-заповідних територій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року) / Ред.кол. Будз М.Д. та ін. – Ріве, ВАТ “Рівненська тдрукарня”, 2009. – С - 450-453.

**Authors :** Абрамчук А.В., Абрамчук С.В.

---

*\* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт [iba.ptushki.org](http://iba.ptushki.org)*