


## Наименование ТВП: Освейский



© С. Левый

**Код:** BY001

**Географические координаты:** 56°05' N 28°07' E

**Административная принадлежность:** Витебская область:  
Верхнедвинский район

**Площадь:** 29654 га

**Критерии:** A1, B2, A4i

**Национальный природоохранный статус:** ландшафтны заказнік  
рэспубліканскага значэння «Асвейскі»

**Международный природоохранный статус:** ТВП міжнароднай  
значнасці, утворана ў 1998 годзе. Рамсарская тэрыторыя з 2002 г. (крытэрыі 1а)

**Общее описание:**

Тэрыторыя заказніка ўяўляе сабой буйны комплекс азёр, лясоў, пераходных і верхавых балот, нізінных балот адносна мала. Ядром заказніка з'яўляецца возера Асвейскае, якое мае важнае гідралагічнае і кліматаўтвараючае значэнне для вялікага рэгіёна паўночнай часткі Беларусі. Вялікую частку ўгоддзя займаюць верхавыя і пераходныя балоты, якія пакрыты хвойнікамі, бярэзнікамі і алешнікамі. Сярод балот раскіданы нешматлікія мінеральныя астравы. Лясы займаюць каля 30% агульнай плошчы заказніка, лугі – 6%, хмызнякі пакрыта 4% тэрыторыі.

Гідраграфічная сетка добра развіта і прадстаўлена азёрамі, рэкамі і шматлікімі меліяратыўнымі каналамі. Галоўная водная артэрыя тэрыторыі – рака Свольна, якая адносіцца да басейна Заходняй Дзвіны. Найбольш значным натуральным вадаёмам з'яўляецца возера Асвейскае, плошча якога складае 47,95 км<sup>2</sup> (пасля Нарачы гэта другі па велічыні прыродны вадаём рэспублікі). Возера адносіцца да эўтрофнага тыпу, яно мелкаводнае, сярэдняя глыбіня не перавышае 2 метраў. У яго ўпадаюць некалькі невялікіх рэк і каналаў, аднак прыток вады ў вадаём адбываецца, галоўным чынам, за кошт ападкаў. Апошнія дваццаць гадоў возера інтэнсіўна зарастае надводнай расліннасцю і паступова страчвае сваё значэнне ў якасці рыбапрамысловага вадаёма і месца гнездавання вадаплаўных птушак. Найбольш верагодная прычына такіх змяненняў – зніжэнне ўзроўню вады, якая выцякае з возера па каналу Дзегцяроўка. Для пад'ёму і стабілізацыі ўзроўню вады ў возеры, на гэтым канале было ўзведзена гідратэхнічнае збудаванне са шлюзам-рэгулятарам, загараджальнай дамбай і водападводзячым каналам. Аднак цяпер дамба знаходзіцца ў нездавальняючым тэхнічным стане. Другой верагоднай прычынай зніжэння ўзроўню вады могуць быць вынікі торфараспрацовак, якія праводзіліся недалёка ад возера.

Лесагаспадарчая дзейнасць на тэрыторыі заказніка вядзецца ў рацыянальных памерах. З іншых відаў гаспадарання пераважаюць здабыча торфу, прамысловы і аматарскі збор грыбоў і ягад, рэгламентаванае паляванне. У Асвейскім возеры ёсць значныя запасы сапрапяляў высокай якасці, прыгодных для прамысловай здабычы.

## **Основные биотопы:**

Лясы - каля 30%, рэдкалессі і хмызнякі - каля 8%, вадаёмы і вадацёкі - каля 26% (з іх воз. Асвейскае - 23%), балоты - каля 22%, лугі (пераважна сенакосныя) - каля 4%, сельгасугоддзі і іншыя трансфармаваныя месцапражывання - больш 11%.

## **Птицы:**

Арнифауна прадстаўлена 206 відамі, 174 з якіх гняздзяцца. За 25-летні перыяд у выніку змены экалагічнага становішча, выкліканага зарастаннем возера Асвейскага і некаторых іншых антрапагенных фактараў, адбыліся кардынальныя змены колькасці шматлікіх, у тым ліку ключавых відаў птушак водна-балотнага комплексу. Знізілася колькасць шэрагу відаў качак (нырок-сівак *Aythya ferina* і чубаты нырок *Aythya fuligula*, качка-крыжанка *Anas platyrhynchos*, качка-чырка *Anas querquedula*), лыскі *Fulica atra*, крычак, чайкі-рыбачкі *Larus ridibundus*. Зніклі на гнездаванні чырванашыйная *Podiceps auritus* і шэрашчокая коўры *Podiceps grisegena*. Прыкладна на стабільным узроўні падтрымліваецца колькасць толькі ў вялікай коўры *Podiceps cristatus* і качкі-цыранкі *Anas crecca*, у такіх нешматлікіх відаў як звычайны гогаль *Vusephalacalangula*, качка-лапаноска *Anas clypeata* і шызая чайка *Larus canus* адзначаная некаторая станоўчая дынаміка.

Праз Асвейскі прыродны комплекс праходзіць міграцыя паўночна-усходніх папуляцый вадаплаваючых і каляводных відаў птушак (зарэгістраван 41 віў з агульнай колькасцю да 26000 асобін). Найболей высокая канцэнтрацыя вадаплаваючых птушак назіраецца звычайна ў першай дэкадзе кастрычніка. У перыяд вясновай міграцыі варта адзначыць высокую канцэнтрацыю гусі-гуменніцы *Anser fabalis* (3 - 8,5 тыс. асобін) і качкі-свіцьвы *Anas penelope* (3,5 - 4 тыс. асобін). Колькасць шэрага журавля *Grus grus* восенню дасягае 1500-1800 асобін.

Таксама ТВП мае значэнне для захавання значнай колькасці пар на гнездаванні дубальта *Gallinago media* і чаплі-бугая *Botaurus stellaris*.

## Другие группы животных:

Выяўлена 23 віда рыб, 9 відаў амфібіяў, 5 - рэптылій і 38 - звяроў.

## Состояние редких видов птиц:

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (1988-2007)	Критерий ТВП
Гуменник <i>Anser fabalis</i>	мг	3000-8500 ос	2005-2007	Э		A4i
Пискулька <i>Anser erythropus</i>	мг	0-10 ос	2005-2007	П		

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (1988- 2007)	Критерий ТВП
Шилохвость <i>Anas acuta</i>	мг	0-10 ос	2005-2007	П		
Луток <i>Mergus albellus</i>	мг	2-40 ос	2005-2007	П		
Крохаль длинноносый <i>Mergus serrator</i>	мг	0-5 ос	2005-2007	П		
Крохаль большой <i>Mergus merganser</i>	мг	1-10 ос	2005-2007	П		
Куропатка белая <i>Lagopus lagopus</i>	гн	6-8 п	2008	Э	↓	
Гагара чернозобая <i>Gavia arctica</i>	зал	2-4 ос	2005-2007	П		
Выпь большая <i>Botaurus stellaris</i>	гн	20-30 с	2007	Э	↓	B2
Выпь малая <i>Ixobrychus minutus</i>	гн	1-3 п	2005-2007	Э		
Черный аист <i>Ciconia nigra</i>	гн	4-6 п	2005-2007	Э	↔	
Коршун черный <i>Milvus migrans</i>	гн	1 п	2007	Т		
Орлан- белохвост <i>Haliaeetus albicilla</i>	гн	1 п	2007	Т	↔	

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (1988- 2007)	Критерий ТВП
Змееяд <i>Circaetus gallicus</i>	гн	2-3 п	2007	Э		
Малый подорлик <i>Aquila pomarina</i>	гн	3-5 п	2007	Э	↔	
Беркут <i>Aquila chrysaetos</i>	гн?	+	2005	Т		
Скопа <i>Pandion haliaetus</i>	гн	1 п	2007	Т	↓	
Пустельга обыкновенная <i>Falco tinnunculus</i>	гн	6-7 п	2005-2007	Э		
Дербник <i>Falco columbarius</i>	гн	5-6 п	2007	Э	↔	
Чеглок <i>Falco subbuteo</i>	гн	4-5 п	2006-2007	Э	↔	
Погоньш малый <i>Porzana parva</i>	гн	5-10 с	2007	Э		
Коростель <i>Crex crex</i>	гн	15-25 с	2005-2007	Э		
Журавль серый <i>Grus grus</i>	гн	10-15 п	2007	Э	↓	
Журавль серый <i>Grus grus</i>	мг	1500-1800 ос	2005-2007	Э	↔	A4i

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (1988- 2007)	Критерий ТВП
Ржанка золотистая <i>Pluvialis apricaria</i>	гн	5-10 п	2007	Э	↓	
Турухтан <i>Philomachus pugnax</i>	гн	1-3 п	2007	Э		
Гаршнеп <i>Lymnocyptes minimus</i>	гн	0-2 п	2005-2007	Э		
Дупель <i>Gallinago media</i>	гн	10-30 п	2005	Э		A1
Веретенник большой <i>Limosa limosa</i>	гн	1-2 п	2007	Э		
Кроншнеп средний <i>Numenius phaeopus</i>	гн	3-5 п	2007	Э	↓	
Кроншнеп большой <i>Numenius arquata</i>	гн	5-10 п	2007	Э	↔	
Улит большой <i>Tringa nebularia</i>	гн	2-5 п	2007	Э	↓	
Чайка малая <i>Hydrocoloeus minutus</i>	гн	6 п	2007	Т		
Чайка сизая <i>Larus canus</i>	гн	4-6 п	2007	Э	↔	

Виды	Статус	Количество	Год/период оценки	Точность оценки	Тренды (1988- 2007)	Критерий ТВП
Филин <i>Bubo bubo</i>	гн	1-2 п	2007	Э		
Сыч воробьиный <i>Glaucidium passerinum</i>	гн	5-6 п	2006-2007	Э	↑	
Неясыть длиннохвостая <i>Strix uralensis</i>	гн	9-10 п	2006-2007	Э	↔	
Неясыть бородатая <i>Strix nebulosa</i>	гн	1-3 п	2006	Э		
Сова болотная <i>Asio flammeus</i>	гн	0-6 п	2005	Э	↔	
Дятел зеленый <i>Picus viridis</i>	гн	1-3 п	2005-2007	Э		
Дятел белоспинный <i>Dendrocopos leucotos</i>	гн	10-20 п	2006-2007	Э		
Дятел трехпалый <i>Picoides tridactylus</i>	гн	20-30 п	2006-2007	Э		

### **Другие редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды:**

Звяры: барсук *Meles meles*, бурый мядзьведзь *Ursus arctos*, еўрапейская рысь *Lynx lynx*.

Насякомыя: дазоршчык-імператар *Anax imperator*, бліскучы жужаль *Carabus nitens*

, аксамітніца Юта *Oeneisjutta*.

Расліны: баранец звычайны *Hyperziaselago*, гарлачык жоўты малы *Nupharpumila*, журавіны дробнаплодныя *Oxycoccusmicrocarpus*, кізільнік чарнаплодны *Cotoneaster melanocarpus*, марошка прысадзістая *Rubuschamaemorus*, лінея паўночная *Linnaea borealis*, гарычка крыжападобная *Gentianacruciata*, гарычавачка гаркаватая *Gentianellaamarella*, верабейнік лекавы *Lithospermumofficinale*, змегалоўнік Руйша *Dracosephalumruyschiana*, бадзяк разналісты *Cirsiumheterophyllum*, шпажнік чарапіцавы *Gladiolusimbricatus*, броўнік аднаклубневы *Herminiummonorchis*, ладдзян трохнадрэзаны *Corallorhizatrifida*, ласняк лёзеля *Liparisloeselii*, тайнік яйцападобны *Listeraovata*.

### **Угрозы:**

- антрапагенная эўтрафікацыя возера Асвейскае, якая выклікана сцёкамі вады з сельгасугоддзяў і торфараспрацовак, камунальна-бытавых прадпрыемстваў, жывёлагадоўчых ферм;
- парушэнне гідралагічнага рэжыму ў выніку дзейнасці торфапрадпрыемства;
- памяншэнне ўзроўню вады ў возеры вядзе да змен яе якасных паказчыкаў, хуткаму зарастанню возера, змяншэнню рыбапрадукцыйнасці, зніжэнню яго значэння для вадаплаўных птушак;
- прамысловае рыбалоўства магло стаць адной з прычын памяншэння запасаў рыбы ў возеры;
- пажары на асушаных балотах;

### **Рекомендации по сохранению:**

- Дазволіць працы па аднаўленню натуральнага гідралагічнага рэжыму.
- Увесці перыяды пакою на час гнездавання і міграцыі птушак.
- Мэтазгодна прадугледзець магчымасць кіраванага зімовага выпальвання сухой травяністай расліннасці, для паляпшэння ўмоў пражывання ахоўваемых відаў і папярэджанні пажараў, асабліва ў краявой зоне балота Асвейскае.
- Рэалізаваць мерапрыемствы Плану кіравання заказнікам "Асвейскі", распрацаванага НППЦ НАН Беларусі па біярэсурсам у 2008 г.

### **Источники информации:**



Асабістыя паведамленні: Астроўскі А.А., Дзмітрынок М.Г.

Положение о республиканском ландшафтном заказнике «Освейский»  
(утверждено Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 03.01.2000 г. № 4).

План управления республиканским ландшафтным заказником «Освейский»  
(разработан ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», 2008 г.).

Скарбы прыроды Беларусі. – Мн.: Беларусь, 2005. – 215 с. (Інфармацыю падрыхтавалі: Бірукоў В.П., Вальчэўскі Э.Э., Іваноўскі У.В., Казулін А.В.).

**Составители :** Ямінскі Б.В.

---

*\* Использование размещенной здесь неопубликованной информации для научных публикаций без письменного соглашения ее авторов запрещено. В случае использования части контента или страницы целиком на других интернет-ресурсах, обязательна ссылка на авторов и сайт [iba.ptushki.org](http://iba.ptushki.org)*